


Aus der Medizinischen Klinik der Universität Bonn a. Rh.

Direktor: Professor Dr. Martini.

Pneumotachographische Untersuchungen bei Asthmakranken *)



INAUGURAL-DISSERTATION

zur

Erlangung der Doktorwürde

der Hohen Medizinischen Fakultät der
Rheinischen Friedrich Wilhelms-Universität

zu Bonn.



Vorgelegt am 4. Februar 1937

von

Lothar Walters

aus Montabaur (Westerwald).

*) Mit Unterstützung des Westdeutschen Tuberkuloseforschungsinstitutes.

Bonn 1937

Anton Brand, Bonn

Gedruckt
mit Genehmigung der medizinischen Fakultät
der Universität Bonn.

Referent: Dozent Dr. Heymer.

Korreferent: Prof. Dr. Martini.



Meinen lieben Eltern!

1. 1. 1. 1.
1. 1. 1. 1.
1. 1. 1. 1.

Die Atmung ist ein komplizierter physiologischer Vorgang und steht in inniger Beziehung zum Kreislauf. Man kann eine äußere und eine innere Atmung unterscheiden. Sowohl mechanische Einflüsse als auch Änderungen im physiologisch-chemischen Gasaustausch zwischen Außenluft und Blut vermögen den Atmungsvorgang zu beeinflussen. Konstitution, Alter, Training, Zusammensetzung der Atemluft, körperliche Anstrengung, Pharmaka, vermögen das Bild des Atmungsablaufs zu beeinträchtigen. Man versuchte von den verschiedensten Gesichtspunkten aus beim Gesunden und beim Kranken die Atmungsverhältnisse zu studieren.

Marey benutzte den Thorakographen, um Schwankungen einzelner Thoraxpunkte aufzuzeichnen. Mit Hilfe der Spirometrie bestimmte man Frequenz, Regelmäßigkeit und die geatmete Luftmenge. Ewald leitete die Atemluft in eine Flasche und registrierte die in der Flasche auftretenden Druckschwankungen, um so Ein-
sicht in die Atemfunktion zu gewinnen. Rosenthal und J. Gad lehnten diese Methode ab. Eine weitere Möglichkeit zu Atmungsstudien wurde gesehen in der Registrierung der Atemgeschwindigkeit. Bergeon und Katus versuchten dies zu erreichen, indem sie die Versuchspersonen gegen eine dünne Platte atmen ließen, die durch zwei Federn in ihrer Lage gehalten wurde. Durch die Atemluft wurde die Platte bewegt, und man konnte so die Strömungsgeschwindigkeit durch ein aufgeklebtes Spiegelchen auf einen photographischen Filmstreifen aufzeichnen. Es kam darauf an, die einzelnen Vorgänge bei der Atmung genau und möglichst einfach zu analysieren. Ein Apparat, der diesem Zweck genügt, ist der Pneumotachograph von Fleisch.

Die Konstruktion des Fleisch'schen Pneumotachographen geht von dem Poisseuille'schen Gesetz aus, das besagt, daß in einem Röhrensystem bei gleitender Strömung im System an zwei verschiedenen Stellen des Rohres Druckgefälle besteht. Der

Pneumotachograph besteht aus dem Röhrensystem, an das ein Mundstück für die durchatmende Person angefügt wird. Um in dem Röhrensystem lineare Strömung, d. h. turbulenzfreie, in einer Richtung verlaufende Strömung zu erzielen, ist das System aus vielen (69) einzelnen Röhrchen von etwa 2 mm Durchmesser zusammengesetzt. Von einem dieser Röhrchen sind in 15 cm Abstand senkrecht zwei Ansatzröhrchen aus Silber abgeführt. Bei gleitender Strömung im System findet man nun in diesen beiden Ansatzröhrchen eine Druckdifferenz, die mit Hilfe zweier gleich langer Gummischläuche auf eine Druckdifferentialkapsel übertragen wird. Die Kapsel ist durch eine Gummimembran in eine vordere und in eine hintere Druckdifferentialkammer getrennt. Bei Druckdifferenz im System überträgt sich diese auf die Gummimembran, die sich entsprechend der Druckdifferenz vor- oder einwärts wölbt. Ein aufgeklebtes Spiegelchen, das von einer Lichtquelle angestrahlt wird, reflektiert das Licht auf einen rotierenden Filmstreifen. Ein Zeitschreiber gibt die Geschwindigkeit an, mit der der Film abrollt. Mit diesem Apparat erhält man sehr genaue Aufzeichnungen, da schon kleinste Strömungsschwankungen der Atemluft registriert werden können. Aus den erhaltenen Kurven, den Pneumotachogrammen, kann man ablesen:

1. Typus der Atmung.
2. Inspirationszeit und Expirationszeit.
3. Größte Geschwindigkeit der Atemluft.
4. Mittlere Geschwindigkeit der Atemluft.
5. Frequenz.
6. Minutenvolumen.

Um festzustellen, daß der Pneumotachograph einwandfrei arbeitet, ist eine Eichung notwendig. Es muß Proportionalität zwischen Atemgeschwindigkeit und Ausschlagsgröße bestehen. Aus einer Gasbombe läßt man durch eine vorgeschaltete Gasuhr einen konstanten Gasstrom fließen, und man läßt den resultierenden Ausschlag aufzeichnen. Mit Hilfe einer Stoppuhr errechnet man das Sekundenvolumen des konstanten Gasstromes. Sekundenvolumen dividiert durch Ausschlagsgröße ergibt den Eichungswert,

eine Konstante. Besteht bei verschiedenen durchgeleiteten Strömen in Bezug auf Ausschlagsgröße Proportionalität, d. h. ist das Sekundenvolumen dividiert durch Ausschlagsgröße gleich der Konstanten, so hat der Apparat seine ausreichende Genauigkeit. Zu Beginn und zum Schluß des Versuches läßt man, ohne daß durch das System geatmet wird, ein Stück Film abrollen. Diese beiden Linien werden miteinander verbunden und man erhält so die Nulllinie. Die Ausschläge, die bei der Atmung oberhalb der Nulllinie sich aufzeichnen, geben den Verlauf des Expiriums wieder, die Aufzeichnungen unterhalb der Nulllinie den Verlauf des Inspiriums. Inspirationszeit und Expirationszeit sind dargestellt durch den Schnittpunkt der Atemkurve mit der Nulllinie. Die maximale Geschwindigkeit errechnet sich aus dem größten Abstand von der Nulllinie mit Hilfe des Eichwertes. Durch planimetrische Ausmessung der Kurvenflächen kann man nach der einfachen Formel: $\frac{\text{EW mal Fläche}}{\text{mm/sec}}$ das Volumen bestimmen. (mm/sec ist die

Geschwindigkeit des rotierenden Filmes.) Die mittlere Geschwindigkeit ist der Quotient: Volumen durch Zeit. Das Minutenvolumen ist Volumen mal Frequenz. Der schädliche Raum im ganzen System beträgt etwa 90 ccm. Die Nasenatmung wird durch eine Klemme ausgeschaltet, was allerdings nach den Untersuchungen von Hartwich keine wesentlichen Änderungen des Pneumotachogrammbildes hervorrufen soll.

Diese Pneumotachogramme geben einen guten Einblick in den Ablauf der normalen Atmung, wie auch in die Verhältnisse bei Atemstörungen. Sie können uns für die Differentialdiagnose, aber auch für die Therapie Hinweise liefern, ebenso geben sie uns eine Möglichkeit, den therapeutischen Erfolg von Medikamenten zu kontrollieren. Besonders trifft dies zu für das Krankheitsbild des Asthma bronchiale.

Für den gefunden Menschen sind nach den Untersuchungen Bretschgers, die von anderen z. B. Wittkower, Petow, Hartwich u. a. bestätigt wurden, drei Normaltypen für das

Pneumotachogramm zu unterscheiden:

1. das kuppelförmige,
2. das spitzförmige,
3. das plateau förmige.

Für die einzelnen Krankheitsbilder sind kennzeichnende Pneumotachogrammtypen beschrieben worden. Für das Krankheitsbild des Asthma bronchiale und des Emphysems ist eine Kurve charakteristisch, bei der das Inspirium in seiner Form nur selten verändert erscheint, wo aber das Expirium typische Abweichungen zeigt. Die expiratorische Kurve beginnt steil mit einer sogenannten Expirationszacke und fällt dann langsamer in einem spitzkonvexen Bogen zur Nulllinie und läuft dort im letzten Viertel bis Fünftel fast parallel. Plötzlich fällt die Kurve steil zur Nulllinie ab zum Inspirium. Den charakteristischen Verlauf dieser Asthmakurven, besonders den Verlauf des Expiriums versuchten verschiedene Autoren zu deuten.

Engelmann weist darauf hin, daß gleich zu Beginn des Expiriums die Kurve rasch ansteigt, was mit der Annahme einer Stenose scheinbar wenig in Einklang zu bringen sei. Er erklärt dies nun so, daß der größte Teil der Expirationsluft garnicht hinter die stenosierten Bronchiolen gelangt ist, sondern aus den Bronchien stammt und hier nur den sogenannten schädlichen Raum ausfüllt. Macklin hat festgestellt, daß die Bronchien beim Inspirium nach unten länger und breiter, beim Expirium aber kürzer und enger werden. Beim Asthmatiker soll dies nun extrem ausgebildet sein und somit ein größerer schädlicher Raum entstehen. Hartwich nimmt an, daß das Expirium wenigstens zum Teil und besonders im Beginn auf aktiver Muskelkontraktion beruht. Hochrein erklärt die Entstehung der Kurve aus der mechanischen Behinderung der Atmung. Nach Schwenkenbecher soll die Stenose in den feinsten Bronchien zustande kommen durch Schwellung und Spasmus der Bronchialmuskulatur. Die Überdehnung der Alveolen und die maximale Inspirationsstellung des Thorax soll zunächst die größte Ausnutzungsmöglichkeit der aktiven und passiven Ex-

spirationskräfte bieten. Nach Heinbecker soll dann noch eine Kaliberverengerung des gesamten Bronchialbaumes eintreten, die im Anfang eine schnelle, unbehinderte Ausströmung der Atemluft aus den oberen Luftwegen zuläßt. Engelhard führt den charakteristischen Verlauf der Expirationskurve auf die veränderten Elastizitätsverhältnisse in der Lunge zurück, die hervorgerufen werden durch die starke Inspirationsstellung des Thorax. Die Gleichgewichtslage der elastischen Spannung im Brustkorb liegt über der normalen Inspirationsstellung. Geht die Einatmung über die Gleichgewichtslage der Thoraxspannung hinaus, so wird bei der Expiration sowohl die Schwerkraft als auch die vermehrte Spannung gleichzeitig wirken und im Anfang ein schnelles Ausstoßen der Atemluft ermöglichen. Wenn die Ausatmung die Gleichgewichtslage wieder erreicht hat und nach unten zu überschreitet, wirkt die Thoraxspannung den anderen retrahierenden Kräften entgegen, so daß die Ausatmung nur noch langsamer weitergeht.

Durch den Spasmus der Bronchialmuskulatur werden die Bronchien an vielen Stellen eingengt, und durch die Schwellung der Schleimhaut werden vor allem die Bronchiallumina so verlegt, daß der Asthmatiker gegen einen Widerstand atmen muß. Es kommt so zur Stenoseatmung mit den Zeichen der Atemnot, die den Asthmatiker zwingt, tiefer und schneller zu atmen, um genügend Luft in die Alveolen aufnehmen zu können. Die Expirationszeit wird nach den Untersuchungen Engelmanns, Hartwicks, Thiel und Quednaus, Wittkow und Peetows dabei verlängert. Bei jeder Einatmung bleibt nun, da die Ausatmung durch die Stenose behindert ist, ein kleiner Rest Luft in der Lunge zurück, und es kommt so langsam zu einer Lungenblähung. Die Lunge ändert ihre Elastizitätsverhältnisse, und der ganze Thorax behält eine gewisse Inspirationsstellung bei. Da ja bei jedem Atemzug etwas Luft in den Alveolen zurückbleibt, steigt die Residualluft an, die Reserve- und Komplementärluft ebenso die Vitalkapazität nimmt ab. Das Minutenvolumen, das normal etwa 8 Liter beträgt, ist beim Asthmatiker größer. Es kommt daher, daß der Asthmatiker einen größeren Bedarf an Luft hat, um sie richtig

ausnutzen zu können, da er diese ja mit einer größeren Menge Residualluft mischen muß. Um einen genügenden Gasaustausch herbeizuführen, vertieft er die Atmung und beschleunigt sie, was eine Steigerung des Minutenvolumens hervorruft. Der Asthmakurve ähneln auch Pneumotachogramme bei Bronchitis usw. Nach Thiel und Quednau ist die Kurve des Asthmikers durch Medikamente beeinflusbar. Da man annehmen muß, daß bei medikamentöser Behandlung des Asthma eine Umstellung des Atemvorganges eintritt, wurde versucht, den medikamentösen Erfolg pneumotachographisch festzulegen.

So haben Thiel und Quednau Änderungen der Atemkurven beschrieben, die mit Adrenalin und Atropin erreicht wurden. Die mit Adrenalin beeinflussten Kurven ließen nach einigen Minuten eine Umstellung auf ein normales, mehr kuppelförmiges Bild erkennen. Minutenvolumen und Atemtiefe vergrößerten sich, die maximale Geschwindigkeit wurde gesteigert. Durch Atropin erreichten sie Gegenteiliges, denn Minutenvolumen und Atemtiefe verkleinerten sich, die maximale Geschwindigkeit wurde geringer.

Es wurden nun bei Asthmatikern, die in Behandlung der Medizinischen Klinik standen, mit dem Fleisch'schen Pneumotachographen Untersuchungen über den medikamentösen Erfolg von einigen Asthmamitteln angestellt.

11 Kranke, die an Asthma bronchiale litten, wurden mit Asthmolyfin behandelt. Es wurden jeweils 1 ccm Asthmolyfin subkutan injiziert. Eine Kurve wurde jeweils vor, die anderen in gewissen Abständen, die in den Tabellen angegeben sind, geschrieben.

Es zeigte sich nun, daß bei sechs Kranken keinerlei Besserung, von diesen bei zweien sogar starkes Herzklopfen hinzutrat. Bei dreien mit schwerem Asthma bronchiale trat vollkommene Beschwerdefreiheit ein, ebenso bei zweien mit leichterem Asthma eine leichtere Besserung. Was nun das Kurvenbild angeht, so sieht man, daß bei den gebesserten Fällen eine Änderung zum normalen Pneumotachogramm eintritt; aber auch bei einigen anderen Kranken, die subjektiv keine Besserung spürten, ist eine Änderung un-

verkennbar, allerdings nicht so ausgesprochen. Die Zahlenwerte, die sich ergaben, sind in den folgenden Tabellen gezeigt. Fall 1—6 ohne subjektive Besserung. Fall 7—9 mit vollkommener Beschwerdefreiheit. Fall 10—11 leichte Besserung.

Die Inspirationszeit wie die Expirationszeit weisen gewisse Schwankungen auf, die einmal steigende, einmal fallende Tendenz zeigen. Ebenso verhält es sich in Fall 1—6 mit der größten Geschwindigkeit, während bei den übrigen doch ziemlich konstant eine Zunahme erfolgt. Beim Inspirationsvolumen findet man bei Fall 1—6 mehr fallende, bei Fall 7—11 mehr steigende Kurvenwerte. Beim Expirationsvolumen sieht man diese Differenzen in den Kurvenwerten viel ausgeprägter. Bei den ungebesserten Fällen erhält man für das Minutenvolumen Zahlenwerte, die nur geringe Schwankungen aufweisen, bei den drei Schwerkranken mit Besserung zeigt sich eine starke Zunahme desselben. Bei den beiden letzten Fällen ist das Gegenteil zu erkennen.

	Aufnahme	Inspiration :						Expiration :						Frequenz	Minutenvolumen
		Insp.-Zeit	vol.	gr. Geschw.	mittl. G.	v. max.	v. mittel	Exp.-Zeit	vol.	gr. Geschw.	mittl. G.	v. max.	v. mittel		
I.	Vor:	1,19	436	593	366	1,45		1,68	479	627	285	2,20	19	8280	
	10'p	1,08	320	577	296	1,95		1,71	351	777	205	3,77	21	6880	
	20'p	1,00	425	563	425	1,32		1,70	470	663	276	2,40	20	8710	
II.	Vor:	0,91	462	720	508	1,41		2,10	597	517	284	1,77	18	8320	
	4'p	0,98	513	800	524	1,52		2,41	583	600	241	2,48	17	9413	
	10'p	1,10	454	678	413	1,64		3,55	547	525	154	3,40	12	5450	
	20'p	0,99	533	825	538	1,53		2,41	569	570	236	2,41	17	9600	
III.	Vor:	1,28	373	413	291	1,41		1,78	378	347	212	1,63	19	7090	
	4'p	1,18	365	467	309	1,50		1,52	375	477	247	1,49	21	7670	
	10'p	1,13	299	407	265	1,53		1,50	324	370	216	1,71	22	6580	
	20'p	1,18	304	410	257	1,59		1,61	301	387	187	2,06	20	6290	

I. Ra., 23 Jahre, Hilfsarbeiter.

II. We., 56 Jahre, Arbeiter.

III. Cha., 55 Jahre, Fuhrmann.

	Aufnahme	Inspiration :					Expiration :					Frequenz	Minutenvolumen
		Insp.-Zeit	vol.	gr. Geschw.	mittl. G.	v. max. v. mittl.	Exp.-Zeit	vol.	gr. Geschw.	mittl. G.	v. max. v. mittl.		
IV.	Vor:	0,85	234	390	275	1,41	1,24	265	402	213	1,88	28	6560
	4'p	0,72	262	510	364	1,40	1,06	255	427	241	1,76	33	8650
	10'p	0,70	217	450	310	1,44	1,20	224	373	187	1,99	31	6740
	20'p	0,78	223	438	286	1,53	1,20	250	393	208	1,88	27	6030
V.	Vor:	1,05	479	620	456	1,36	1,25	552	670	442	1,51	23	11017
	1'p	1,12	478	547	427	1,28	1,52	532	660	350	1,88	21	10038
	4'p	1,25	649	743	519	1,43	1,51	561	737	371	1,51	21	13629
	20'p	0,95	402	623	423	1,47	1,65	479	547	290	1,88	22	9050
	30'p	1,00	387	583	387	1,50	1,48	455	553	308	1,79	23	8900
VI.	Vor:	1,87	658	513	352	1,45	2,21	709	768	321	1,90	14	9210
	4'p	1,88	727	553	386	1,43	2,26	761	667	337	1,98	14	10100
	10'p	1,60	516	483	322	1,49	2,10	568	727	270	2,68	16	8260
	20'p	1,51	603	583	399	1,46	1,99	661	703	332	2,11	17	10200
	30'p	1,55	565	560	364	1,53	1,75	643	750	367	2,04	18	10103
VII.	Vor:	1,103	369	477	335	1,42	1,60	402	387	251	1,53	21	7750
	4'p	1,13	378	493	335	1,47	1,40	388	460	277	1,60	23	8710
	10'p	1,20	402	507	335	1,51	1,40	414	430	296	1,45	22	8860
	20'p	1,10	389	547	353	1,54	1,32	436	500	330	1,51	24	9340
	30'p	1,10	455	597	413	1,44	1,20	452	580	376	1,54	24	12700
VIII.	Vor:	1,20	368	433	307	1,41	1,60	421	400	263	1,52	20	7370
	6'p	1,49	652	590	437	1,34	2,08	643	547	309	1,76	16	10400
	10'p	1,28	493	543	385	1,41	1,64	575	570	350	1,62	19	9370
	20'p	1,35	606	620	449	1,38	1,58	644	653	407	1,60	20	12100
IX.	Vor:	1,08	388	447	359	1,25	1,20	416	437	346	1,26	23	8940
	10'p	1,02	437	413	428	0,96	1,25	460	503	368	1,36	25	10900
	20'p	0,93	472	613	508	1,20	1,48	495	408	336	1,21	24	11300

IV. Ku., 30 Jahre, Hilfsdreher.

V. St., 41 Jahre, Beruf: Schlosser.

VI. Ju., 45 Jahre, Beruf: Former.

VII. Wo., 57 Jahre, Steingutpacker.

VIII. Sö., 62 Jahre, Landarbeiter.

IX. Stev., 53 Jahre, Beruf: Stellwerksmeister.

	Aufnahme	Inspiration :					Expiration :					Frequenz	Minutenvolumen
		Insp.-Zeit ₁	vol.	gr. Geschw.	mittl. G.	v. max. v. mittl.	Exp.-Zeit	vol.	gr. Geschw.	mittl. G.	v. max. v. mittl.		
	Vor:	1,32	432	437	331	1,32	2,30	428	383	166	2,30	15	8740
	4'p	1,36	472	520	347	1,49	2,17	502	447	231	1,93	16	7560
X.	10'p	1,50	351	366	234	1,56	2,30	436	380	190	2,00	15	5450
	20'p	1,50	432	400	288	1,38	2,02	436	407	216	1,88	16	6920
	Vor:	1,21	294	370	243	1,52	2,53	329	412	130	3,16	23	6770
IX.	1'p	0,86	317	513	369	1,39	0,90	373	647	414	1,56	21	6670
	9'p	1,60	440	473	275	1,72	1,70	517	794	304	2,60	21	9240
	17'p	1,70	274	302	161	1,21	1,52	360	477	237	2,01	17	4670

X. Win., 38 Jahre, Bürogehilfe.

XI. Bol., 41 Jahre, Bäcker.

Es folgt eine Kurvenserie von dem Kranken Wo. (Fall 7) am Schluß der Arbeit.

Ein anderes Asthmamittel, das Taumasthma, wurde bei fünf Kranken angewandt. Bei einem Kranken, der in stationärer Behandlung stand, konnte die Wirkung an zwei verschiedenen Tagen kontrolliert werden. 2 Kranke zeigten keine Besserung, während die anderen drei auf das Mittel gut ansprachen. Die Wirkung setzte durchschnittlich nach 4—7 Min. ein und hielt bis zu 2 Stunden an.

Als Besserung faßten wir es auf, wenn der Kranke angab, die Atemnot lasse nach, er fühle sich erleichtert, das Beengende auf der Brust falle. Alle objektiven Besserungen sind aus der Kurve abzulesen. Bei dem Kranken St. wirkte das Mittel im 2. Versuch erst nach 20 Minuten. Dieses Mal wurden die Tabletten (2 Stück) kurz nach einer größeren Mahlzeit gegeben, sodaß wahrscheinlich die Resorption und damit die Wirkung später eintrat. Die Kurven bei Pl. und Ro. zeigen keine besondere Änderung; lediglich ist bei Pl. eine starke Aufsplitterung der Kurve zu beobachten, was wohl eine Erklärung in dem starken Herzklopfen findet, das der Kranke

nach 6 Minuten bekam, und das so mit der Systole synchronen Zacken in dem Kurvenbilde verursachte.

Die folgende Tabelle soll eine Übersicht über die Änderungen der Kurvenbilder geben:

- + bedeutet Zunahme der Werte.
- bedeutet Abnahme der Werte.
- bedeutet Gleichbleiben.
- + bedeutet erst Abnahme, dann Zunahme.

Name:	Ro.	Pl.	Bo.	So.	St.	St.(2)
Besserung:	—	—	+	+	+	+
Insp'zeit:	—	—	+	+	+	+
Exp'zeit:	○	+	+	+	+	+
vol. insp.:	—	—	+	+	+	+
vol. exp.	—	—	+	+	+	+
gr. G. insp.	○	⊖	⊕	—+	—	—+
gr. G. ex.	○	—	+	+	+	+
Frequenz:	+	○	—	—	—	—
Minutenvol:	—	—	—	—	—	—

Taumasthman:

Aufnahme	Inspiration:						Expiration:						Frequenz	Minutenvolumen
	Insp.-Zeit	vol.	gr. Geschw.	mittl. G.	v. max.	v. mittl.	Exp.-Zeit	vol.	gr. Geschw.	mittl. G.	v. max.	v. mittl.		
Vor:	1,70	343	320	201	1,58		1,80	371	303	206	1,47	16	5490	
4'p	1,31	278	306	212	1,44		1,72	321	296	187	1,58	19	5280	
a) 10'p	1,50	291	313	194	1,61		1,80	350	290	194	1,49	17	4950	
20'p	1,38	323	353	234	1,50		1,70	339	293	199	1,47	18	5490	

a) Ro., 23 Jahre, Bauarbeiter.

	Aufnahme	Inspiration:					Expiration:					Frequenz	Minutenvolumen
		Insp.-Zeit	vol.	gr. Geschw.	mittl. G.	v. max v. mittel	Exp.-Zeit	vol.	gr. Geschw.	mittl. G.	v. max. v. mittel		
b)	Vor:	1,40	414	517	296	1,74	1,78	471	617	265	2,32	18	7460
	7'p	1,61	445	500	276	1,80	2,35	504	493	197	2,49	14	6230
	10'p	1,34	336	453	251	1,80	1,89	394	537	208	2,57	18	6060
	20'p	1,18	336	493	284	1,75	3,05	365	433	119	3,62	17	5710
c)	Vor:	1,43	346	370	242	1,53	1,50	342	427	228	1,86	21	7260
	4'p	1,61	373	366	231	1,58	1,64	424	633	275	2,30	18	6720
	10'p	1,48	365	380	246	1,54	1,60	371	447	232	1,92	18	6570
	20'p	2,25	490	403	218	1,85	2,20	442	473	201	2,35	13	6380
d)	Vor:	1,14	444	549	389	1,41	1,95	478	577	245	2,35	18	7990
	10'p	1,20	504	643	421	1,53	3,29	502	365	152	2,39	13	6550
	20'p	1,25	500	626	416	1,50	2,78	531	431	191	2,83	14	7280
	30'p	1,50	397	407	265	1,53	3,20	391	316	122	2,58	12	4770
e)	Vor:	1,30	485	570	373	1,52	1,55	565	657	279	2,34	19	9210
	4'p	1,52	515	520	339	1,53	2,02	630	673	312	2,15	15	7730
	10'p	1,43	484	497	338	1,46	1,89	533	623	282	2,21	16	7750
	20'p	1,69	641	653	379	1,72	2,10	709	787	337	2,33	14	8980
f)	30'p	1,90	653	620	343	1,80	2,39	732	790	306	2,58	12	7840
	Vor:	1,33	611	653	459	1,42	1,89	618	643	327	1,96	17	10400
	4'p	1,30	532	643	409	1,57	1,96	548	640	279	2,29	18	9590
	10'p	1,25	519	663	415	1,59	1,88	513	640	273	2,34	19	9870
f)	20'p	1,24	514	637	416	1,53	1,83	490	643	272	2,36	18	9260
	30'p	1,42	699	760	492	1,54	2,04	721	784	353	2,21	15	10400
	60'p	2,02	792	660	392	1,68	2,95	674	487	228	2,13	11	8710
	75'p	2,61	867	643	332	1,93	3,79	942	577	248	2,32	9	7800
f)	90'p	2,80	905	617	323	1,90	4,25	966	547	227	2,40	7	6330
	120'p	3,89	954	507	245	2,06	5,52	1030	523	187	2,13	6	5720

b) Pl., 17 Jahre, kein Beruf.

c) Bo., 41 Jahre, Bäcker.

d) So., 63 Jahre, Kaufmann.

e) St., 41 Jahre, Schlosser (1. Aufnahme).

f) St., 41 Jahre, Schlosser (2. Aufnahme).

Es folgt eine Kurvenserie von dem Kranken St. mit Taumasthman am Schluß der Arbeit.

Bei einem Kranken, der mit stärkster Atemnot in die Ambulanz der Medizinischen Klinik kam, konnte mit einer Inhalation von Bronchovydrin schlagartig Besserung erzielt werden. Vor der Inhalation konnte im Anfall eine Kurve geschrieben werden. Der Kranke inhalierte dann aus einem Zerstäubungsinhalator Bronchovydrin. Nach ungefähr 1 Minute trat Beschwerdefreiheit ein, und es wurde sofort wieder eine Kurve geschrieben, und dieses wiederholte sich nach 10, 20 und 30 Minuten. Nach ungefähr 7 Minuten stellten sich die Beschwerden wieder ein und nahmen bis zum Ende des Versuches, bis nach 30 Minuten, auf ihre alte Stärke wieder zu. Die nachfolgende Tabelle gibt eine Übersicht über die gefundenen Zahlenwerte.

Pl.	Vor:	2'p	10'p	20'p	30'p
Insp'zeit	0,88	1,3	1,02	0,91	0,89
vol. insp.	589	844	467	454	508
gr. G. i.	907	917	613	690	840
mittl. G.	670	649	458	499	571
v. max.					
v. mittel i.	1,35	1,41	1,33	1,38	1,47
Frequenz:	25	18	20	23	27
Exsp'zeit:	1,59	2,10	1,95	1,72	1,47
vol. exsp.	594	957	466	485	561
gr. G. ex.	590	750	410	460	580
mittl. G.	373	455	239	283	382
v. max.					
v. mittel ex.	1,57	1,64	1,71	1,61	1,51
Minutenvol:	14 700	15 100	9 350	10 400	13 700

Inspirationszeit und Expirationszeit werden nach der Inhalation stark verlängert, die Frequenz sinkt ab. Das Inspirations- und Expirationsvolumen sind sehr stark vergrößert. Nach ungefähr 10 Minuten nähern sich die Werte den Ausgangszahlen, die sie nach 30 Minuten wieder erreicht haben. Die subjektiven Beschwerden

empfindungen gingen den Änderungen im Pneumotachogramm parallel.

Mit Hilfe des Fleischchen Pneumotachographen wurden Asthmakranke untersucht. Sie wurden mit einem Mittel (Asthmolylin oder Taumasthman), das vielfach die Beschwerden solcher Kranker vermindert oder aufhebt, behandelt. Es wurde der Versuch unternommen, durch das Pneumotachogramm Aufschluß zu erhalten, ob die Wirkung solcher Arzneimittel auch objektiv Änderungen im Atmungsablauf d. h. im Pneumotachogramm erkennen läßt.

Untersucht wurden elf Kranke, die 1 ccm Asthmolylin subkutan injiziert bekamen und 5 Kranke, die je 2 Tabletten Traumasthman per oral verabreicht bekamen. Subjektive Beschwerdefreiheit stellte sich bei insgesamt 8 Kranken ein. Von diesen zeigten fast alle eine deutliche Änderung des Pneumotachogrammes. Es ergab sich nach Asthmolylin eine Zunahme des Minutenvolumens, bei Taumasthman aber eine Abnahme. Das scheint auf den ersten Blick ein Widerspruch zu sein, ist aber sehr wahrscheinlich bedingt dadurch, daß der therapeutische Erfolg erzielt wird durch Verschiedenheit im pharmakologischen Angriff. Dafür spricht auch die Tatsache, daß bei mehreren Kranken Asthmolylin subjektiv und objektiv Effekt brachte, Taumasthman dagegen wirkungslos blieb, wie bei anderen Kranken das Umgekehrte der Fall war. Aus den Untersuchungen geht hervor, daß man bei der therapeutischen Wirksamkeit eines Asthmamittels nicht generell von einer Normalisierung der Atmung sprechen kann, sondern daß die Besserung des Krankheitszustandes mit individuell sehr verschiedenen Atmungsänderungen einhergeht.

Literaturangabe:

I. Archiv für klinische Medizin

- a) Engelhard: Der Wert der Spirometrie für die Klinik der Herzkrankheiten mit Lungenstauung und ihr Ausbau zu einer Funktionsprüfung. 156 (1927) S. 1.
- b) Engelmann: Das pneumotachographische Bild des Asthma bronchiale. 157 (1927) S. 280.
- c) Thiel und Quedenau: Pneumotachographische Studien. 167 (1930) S. 196.

II. Klinische Wochenschrift

- a) Hartwich: Das Pneumotachogramm bei einigen Erkrankungen der Lunge und Luftwege. 1929 II. Bd. S. 1902.

III. Ergebnisse der gesamten Medizin

(Th. Brugsch)

Hochrein und Schneyer: Klinische Pneumotachographie.
18. Band. S. 1.

IV. Asher-Spiro

Fleisch: Ergebnisse über mechanische und propriozeptive Steuerung der Atmung. 36 (1934) S. 249.

V. Zeitschrift für exp. Medizin

Hartwich: Pneumotachographische Untersuchungen über die Atemverhältnisse bei Hyper- und Dyspnoischen. 69 (1930) S. 482.

VI. Die med. Welt

Herbst: Die Wechselbeziehungen von Atmung und Kreislauf.
10. Jahrgang Nr. 2. S. 41.

VII. Zeitschrift für klinische Medizin

- a) Stähelin und Schütze: Spirographische Untersuchungen an Gefunden, Emphysematikern und Asthmatikern. 75 (1912) S. 15.
- b) Neergard und Wirz:
 - 1. Über eine Methode zur Messung der Lungenelastizität. 105 (1927) S. 35.
 - 2. Die Messung der Strömungswiderstände in den Atem-

wegen des Menschen bei Asthma und Emphysem. 105
(1927) S. 51.

c) Wittkower und Petow: Beiträge zur Klinik des Asthma
bronchiale und verwandter Zustände. 105 (1927) S. 215.

d) Schneyer: Pneumotachographische Registrierung bei Ste-
noseatmung. 114 (1930) S. 579.

VIII. Archiv für experimentelle Pathologie

a) Cloetta: Zur experimentellen Pathologie und Therapie des
Asthma bronchiale. 73 (1913) S. 233.


b) Fröhlich und Pick: Zur Kenntnis der Hypophysenpräpa-
rate. 74 (1913) S. 92.

Es sei mir an dieser Stelle gestattet, Herrn Dozenten Dr.
Heymer und Herrn Prof. Dr. Martini für die lebenswürdige
Überlassung der Arbeit sowie für die freundliche Unterstützung
meinen besten Dank auszusprechen.

Lebenslauf.


Am 27. August 1912 wurde ich, Lothar Walters, als Sohn des Studienrates Dr. Ludwig Walters in Montabaur geboren. Nach vierjährigem Besuch der Volksschule war ich 9 Jahre lang Schüler des Kaiser-Wilhelm-Gymnasiums in Montabaur, das ich Ostern 1931 mit dem Zeugnis der Reife verließ. Dann studierte ich 5 Semester Medizin an der Universität in Münster i. W. und bestand dort am Schluß des Sommersemesters 1933 mein Physikum. Das erste klinische Semester war ich in München. Seit dem S.S. 1934 studiere ich in Bonn und bestand im WH. 36/37 in Bonn das ärztliche Staatsexamen.

Injektion von 1 ccm Asthmolysin.




Wo. 57 Jahre Steingutpacker.


Orale Verabreichung von 2 Tabletten Taumasthman.




Ste. 41 Jahre Schlosser.



20' post



30' post



60' post

